

Otázky k vakcínám

U jakých alergií je možné vakcíny podávat?

Nejčastěji podáváme vakcíny u pacientů s alergickou rýmou, alergickými záněty spojivek a astmatem. Pokud se zmíníme o jednotlivých alergenech, pak byla jednoznačně prokázána účinnost vakcín při alergii na pyly, roztoče, včelu, vosu.

Musí být splněny nějaké zvláštní podmínky?

Alergie musí být potvrzena kožními testy nebo odběrem krve a zároveň musí být jasná souvislost mezi obtížemi a expozicí alergenu. Podmínkou je správný výběr vakcíny, obvykle je není možné kombinovat pro více alergenů. Samozřejmý je předpoklad dobré spolupráce pacienta.

Jsou vakcíny bezpečné?

Vakcinace standardizovanými vakcínami je považována za bezpečnou za předpokladu dodržení správného postupu, který může zajistit pouze alergolog. Nežádoucí reakce lze rozdělit na místní (svědění ústní sliznice u kapek a tabletek, zarudnutí, otok a bolestivost v místě vpichu u injekcí) a celkové, kterých předcházíme 30minutovým sledováním pacienta po každé aplikaci injekce.

Kdy mohu očekávat zlepšení stavu po zahájení vakcinace?

Nástup účinku vakcín je pomalý. Většinou vidíme efekt až po 1 roce. Pro hodnocení účinnosti nelze použít kožní testy ani odběr krve. Musíme sledovat celkový stav pacienta, nejlépe podle kalendáře příznaků, který si pacient vede.